

Badanie gastrokopii

Przygotowanie: W dniu badania prosimy pozostać na czczo minimum 7 godzin.

Przeprowadzenie badania: Badanie przeprowadzane jest zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć ewentualne protezy zębowe, zdjąć okulary. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą Lidokainy w aerozolu, lekarz zakłada między zęby pacjenta plastikowy ustnik (celem ochrony delikatnego instrumentu). Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła gastrokop. Ten moment może być nieprzyjemny i wywoływać uczucie dławienia: wymaga współpracy z lekarzem wykonującym badanie i asystującą pielęgniarką. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest tylko nieco nieprzyjemne, w zasadzie bezbolesne. Również pobieranie wycinków jest całkowicie bezbolesne. Instrument służący do badania jest dokładnie dezynfekowany przed każdym badaniem. Z tego powodu zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami co również zabezpiecza przed zakażeniem.

Postępowanie po badaniu: Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez pół godziny po badaniu jeść ani pić, aby uniknąć zakrztuszenia. Proszę poinformować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będzie Pan/Pani odczuwać silny ból jamy brzusznej, albo zaobserwuje czarny stolec. Również wystąpienie innych niejasnych dla Pani/ Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać, jeśli Państwo nie wszystko zrozumieliście albo jeśli chcecie wiedzieć więcej o badaniu, wymienionych tu powikłaniach bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym zabiegiem.